

BENZOCAINA VANNIER® **BENZOCAINA 20% GEL TOPICO**

VENTA BAJO RECETA
Industria Argentina

Composición: Cada 100 g de gel contiene: Benzocaína 20,00 g; Sacarina sódica, Polietilenglicol 400, Polietilenglicol 4000, Sabor frambuesa, Metilparabeno, Rojo punzó 4 R, c.s. **Acción terapéutica:** Anestésico local de uso tópico en mucosas. **Indicaciones:** Está indicado como anestésico local de las mucosas, especialmente de la mucosa bucal para el alivio del dolor. **Acción farmacológica:** Los anestésicos locales bloquean tanto la iniciación como la conducción del impulso nervioso por disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio. De este modo se estabiliza la membrana y se bloquea la despolarización, resultando en una inhibición de la propagación de la acción potencial y subsecuentemente en el bloqueo de la conducción. **Farmacocinética:** Se absorbe mínimamente en forma sistémica. Su acción anestésica es rápida y puede observarse en aproximadamente 30 segundos. **Posología – Modo de uso:** Salvo indicación médica, aplicar el producto sobre la zona a tratar en forma directa o con la ayuda de un hisopo de algodón. Lávese bien las manos antes de aplicar el producto. Debe aplicarse en muy poca cantidad sobre la zona a tratar hasta 3 veces por día. **Advertencias:** Debe evaluarse los riesgos y beneficios de uso en ancianos y durante el embarazo y la lactancia debido a que en estos casos es más factibles el

desarrollo de toxicidad sistémica (ver Precauciones). **Contraindicaciones:** Está contraindicado su uso sistémico, sobre la mucosa ocular, sobre tejido infectado, en pacientes con baja concentración plasmática de colinesterasa o que estén recibiendo anticolinesterasas y en niños menores de 3 años. No utilizar en pacientes con antecedentes alérgicos a algún componente de la fórmula y a otros anestésicos locales del tipo éster (especialmente los derivados del PABA). **Precauciones:** Debe administrarse con precaución en los casos de pacientes alérgicos al PABA, parabenos y parafenilendiamina (presente en las tinturas capilares). **Embarazo y lactancia:** Si bien no se han registrado inconvenientes en el uso de esta medicación durante estas etapas, se recomienda consultar a su médico antes de utilizar esta medicación ya que no se han realizado estudios adecuados en humanos que aseguren la seguridad de su uso. **Uso en pediatría:** Debe utilizarse con precaución en esta población, debido a que un incremento en la absorción de la benzocaína (por uso excesivo) puede resultar en metahemoglobinemia. No utilizar en niños menores de 3 años al menos que el médico u odontólogo así lo indique. **Interacciones medicamentosas:** Los inhibidores de la colinesterasa pueden inhibir el metabolismo de la Benzocaína. La Benzocaína puede antagonizar la actividad antibacteriana de las sulfonamidas. **Reacciones adversas:** los anestésicos locales pueden afectar temporariamente las papilas gustativas

y disminuir la percepción del gusto. La Benzocaína, como cualquier anestésico del tipo éster, puede producir reacciones de hipersensibilización local, que pueden manifestarse como exantemas alérgicos, eritemas, alergias de contacto, etc. **Sobredosificación:** Si bien no se han reportado casos de sobredosificación con este tipo de medicación, una sobredosis de Benzocaína puede presentar manifestaciones como excitación, somnolencia, nerviosismo, náuseas, vómitos, temblores musculares, calambres, tinnitus, visión borrosa, convulsiones, trastornos hepáticos y renales, síndrome de Stevens - Johnson, etc. Ante una eventual sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez:
(011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 y 4658-7777

Presentación: 1 envase conteniendo 15 g.
Conservación: En ambiente fresco entre 15 °C y 30 °C.



Laboratorio VANNIER S.A.
Laboratorio de Especialidades Medicinales

Benito Quinquela Martín 2228 (C1296ADT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tels.: (011) 4303-4365/4366/4114- (011) 5031-1000/1001

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Cert. N° 48.656
Rev. 03/00
IPPRO4511
0122

USO EXTERNO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica

Elaborado en: Intendente Amaro Avalos 4208, Munro, Buenos Aires, Argentina.